



PUC-SP

PERFIL PSICOLÓGICO E TÉCNICA OPERATÓRIA DA OTOPLASTIA NO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA



FUNDAÇÃO SÃO PAULO

Autores: GONELLA, Hamilton Aleardo; PORTELLA, Décio Luíz; MUNIZ, Carolina Utsunomiya; MILANELLO, Edson Vinicius; SALGUEIRO, José Lucas Rodrigues; PACHECO, Maria Eduarda Crusco; SALVADOR, Luis Felipe Prado.

Grande Área: Cirurgia Plástica

•PALAVRAS CHAVE: Orelha externa/cirurgia. Cirurgia plástica/métodos. Otoplastias/cirurgia.

INTRODUÇÃO

Orelhas proeminentes são a alteração congênita mais comum da orelha. Essa deformidade é caracterizada pelo aumento da projeção do pavilhão auricular distante do crânio, e de aspecto disforme, pode ser decorrente da hipertrofia da concha, do apagamento da anti-hélix, ou de ambas as alterações. As diferentes deformidades implicam em técnicas diversas para sua correção. Na orelha em abano ocorre a alteração da medida de dois ângulos: o céfalo-auricular e o escafo-conchal. A orelha de abano, além de proporcionar prejuízo estético para a harmonia facial, está relacionada a problemas psicológicos.

OBJETIVOS

Analisar as técnicas cirúrgicas da otoplastia e avaliar a melhora na qualidade de vida assim como possíveis complicações.

MÉTODO

Estudo prospectivo com descrição das técnicas cirúrgicas em otoplastias realizadas no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Foram analisadas tipo de alterações da orelha de abano, técnicas cirúrgicas e complicações pós-operatórias bem como avaliar a melhora da qualidade de vida pelo questionário Glasgow Benefit Inventory.



Imagem 1: Dissecção da região mastóidea e ressecção de tecido músculo-ligamentar



Imagem 2: Criação da dobra da antihélix por escarificação da cartilagem anterior



Imagem 3: Introdução de agulhas de insulina para posicionamento de sutura



Imagem 4: Introdução de agulhas de insulina para posicionamento de sutura

RESULTADOS

Foram analisadas 17 otoplastias no estudo, sendo a média de idade de 16 anos. Em 16 pacientes foram abordadas ambas as orelhas. Em 15 pacientes foram realizadas técnicas combinadas e em apenas 2 realizado ponto de furnas para correção céfalo-auricular. Apenas 2 apresentaram recidiva, sendo que um foi rebordado precocemente. Não houve nenhum caso de hematoma ou infecção. Os resultados pós-operatórios foram considerados satisfatórios pelos pacientes. A pesquisa sobre o impacto psicossocial da cirurgia plástica conclui que não se trata apenas de reconstrução da harmonia estética, mas também de melhora da qualidade de vida do indivíduo.

CONCLUSÃO

O melhor tratamento de orelhas proeminentes é obtido com a associação de diversas técnicas. A abordagem empregada nos pacientes avaliados tem apresentado resultados naturais, com baixos índices de complicação, satisfazendo os pacientes. A pesquisa de impacto psicossocial traz uma visão de melhora na qualidade de vida, de relacionamento social e autoestima.



Imagem 5: Manutenção das agulhas no momento do ponto escafoconchal



Imagem 6: Protusão conchal corrigida por suturas conchomastóides- Furnas

REFERÊNCIAS

1. AMARAL, Cesar Augusto Raposo do; AMARAL, Cassio Eduardo Raposo do; FIRMIN, Françoise. Classificação cirúrgica de Firmin para deformidades de orelha: análise crítica de série de casos operados no Brasil. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, Brasil, v. 2, n. 26, p.243-249, mar. 2011.
2. Hornos A. Correção de orelha de abano por técnica combinada: análise de resultados e alteração da qualidade de vida. Rev. Bras. Cir. Plást.2013;28(3):406-415
3. PAWAR SS, KOCH CA, MUKARAMI C. Treatment of Prominent Ears and OtoplastyA Contemporary Review. JAMA Facial Plast Surg. 2015;17(6):449-454. doi:10.1001/jamafacial.2015.078