

FERNANDES, B. B. ¹; FERREIRA, G. K. ²; COSTA, R. F. ¹; BRISOTTI, J. L. ^{1 2}

1- Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos - Dr. Paulo Prata, Barretos - SP, Brasil

2- Ambulatório Médico de Especialidades de Barretos – SP, Brasil

INTRODUÇÃO

As lesões vasculares são comuns na população adulta e associam-se à morbidade significativa e redução da qualidade de vida. A padronização da terapêutica tem demonstrado redução na prevalência da doença.

OBJETIVO

Avaliar o impacto psicossocial de diferentes métodos assistenciais empregados na resolução de feridas crônicas na cidade de Barretos/SP, considerando a análise da Qualidade de Vida (QV) destes.

MÉTODOS

Avaliados 22 pacientes, comparando-se duas abordagens terapêuticas: curativos convencionais (higienização, troca diária); e placas de cobertura. O questionário WHOQOL-bref foi utilizado para análise da QV antes e após o tratamento proposto, com análise dos seguintes domínios: físico, psicológico, social e ambiental. O teste utilizado para comparação dos resultados foi de Mann-Whitney.



Figura 1.



Figura 2.

Figura 1 – úlcera vascular de bordas irregulares, com tecido granuloso e pequena quantidade de fibrina, em vigência de tratamento convencional de higienização e troca diária de curativos.

Figura 2 – Após 6 meses de tratamento com uso de placas de cobertura antimicrobiana - método não convencional. Nota-se a o aumento de tecido granuloso, de cicatrização, além da grande quantidade de fibrina revestindo a lesão.

RESULTADOS

População com predomínio de mulheres; idade média 61 anos; tempo médio de lesão 11,5 anos. Aplicado teste Mann-Whitney. No Domínio Físico, a mediana inicial de 10 antes do tratamento para 90 após 12 meses. Análise Psicológica, observou-se inicialmente prejuízo na autoestima e pensamentos negativos (mediana de 30, evoluindo para 90). No Domínio Social, evolução de 40 à 80. Já no Domínio do Meio-ambiente, foi observada mediana de 50, e posteriormente 90. (Figura 3.)




Figura 3 – Gráfico comparando as medianas dos domínios do score de QV, antes e após o tratamento proposto.

CONCLUSÃO

Após implementação de qualificação profissional e de medidas terapêuticas, houve melhora estatisticamente significativa dos índices de QV, com aumento importante das medianas de análise. Esta enfermidade não é problema estético, mas doença crônica, com impacto no estilo e qualidade de vida, sendo comparada, em suas consequências socioemocionais a outras doenças crônicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lal BK. Venous ulcers of the lower extremity: definition, epidemiology, and economic and social burdens. *SeminVasc Surg.* 2015
2. Green J, Jester R, McKinley R, Pooler A. The impact of chronic venous leg ulcers: a systematic review. *J WoundCare.* 2014